

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| □ / □ / □ | □ / □ / □ | □ / □ / □ |
|-----------|-----------|-----------|

| توصیه و درمان | طبقه بندی | ارزیابی | |
|---------------|-----------|---|---|
| | | <p>اگر کودک به علت حادثه یا سایر علائم جراحی فوری مراجعه کرده است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • رنگ پریدگی • خونریزی خارجی • علائم عفونت موضعی • عدم توانایی در حرکت دادن اندام <p>• سفتی شکم</p> | |
| | | <p>اگر کودک با سابقه سوختگی مراجعه کرده است</p> <ul style="list-style-type: none"> • نوع سوختگی ها (درجه I, II, III): - درجه II (سوختگی با ضخامت نسبی) - درجه III (سوختگی عمیق) • محل • درصد سوختگی • (درجه II و III) رامطابق جدول زیر مشخص کنید • نشانه های عفونت • آسیب های همراه (مثل شکستگی) | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • عامل بروز سوختگی چیست؟ • سابقه بیماریهای مزمن |
| | | <p>اگر کودک با سابقه بلع فراورده های نفتی مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • سرفه و تنفس مشکل • بویی که احتمال استفاده از مواد نفتی (نفت، بنزین، گازوئیل) را قطعی کند | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • برای چه مدتی؟ |
| | | <p>اگر کودک با سابقه تماس یا بلع مواد سوزاننده مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • سوختگی دهان و یا مشکل بلع • بویی که احتمال استفاده از مواد سوزاننده را قطعی کند | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • برای چه مدتی؟ |
| | | <p>اگر کودک با سابقه بلع مواد حشره کش و سموم گیاهی مراجعه کرده است:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • مردمک تنگ شده سرسبزجافی • نشانه های پاراسمیپاتیک | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • برای چه مدتی؟ • چه مدتی؟ • چه سمی؟ |
| | | <p>اگر کودک با سابقه مسمومیت دارویی یا مواد مخدر مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • تنفس مشکل • افزایش یا کاهش درجه حرارت بدن • خوردن نامعلوم از هر دارو • خوردن هر مقدار از دارو غیر تجویزی • مصرف هر مقدار از مواد مخدر | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • چه دارویی؟ • برای چه مدتی؟ • چقدر؟ • آیا استفراغ، اسهال، درد شکمی دارد؟ |
| | | <p>اگر کودک با سابقه مارگزیدگی مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • درد موضعی یا تورم • سیاه شدن موضعی • ادرار سیاه • مشکل در بلعیدن و صحبت کردن • مشکل تنفسی • افتادگی پلک و فلج عضلات • خونریزی از لثه ها، بینی، زخم ها یا نقاط خونریزی زیر پوست • محل گزیدگی | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • چه موقع کودک گزیده شده است؟ • آیا در موضعی شدید دارد؟ |
| | | <p>اگر کودک با سابقه گزش حشرات ، عقرب یا رطیل مراجعه کرده است</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • تنفس مشکل یا خرخر • اختلال دید • درد عضلانی متناوب • محل گزیدگی یا وجود نیش | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • تنفس مشکل یا خرخر • اختلال دید • درد عضلانی متناوب • محل گزیدگی یا وجود نیش |
| | | <p>اگر کودک با سابقه گاز گرفتگی مراجعه کرده است :</p> <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • تب، ضعف، بی اشتها • ظهور ناگهانی علائم عصبی • مانند تحریک پذیری، ترس از آب یا نور • افزایش ترشح بزاق • فلج شل پایین رونده | <ul style="list-style-type: none"> • نشانه های خطر • آیا کودک توسط حیواناتی نظیر گربه، سگ یا حیوان مشکوک به هاری گزیده یا یالسیده شده است؟ |

| | | |
|--|--|---|
| □ ادامه درمان و توصیه ها □ ارجاع به | □ فرقی نکرده یا بدتر شده □ بهتر شده | در مراجعه مجدد: تاریخ/...../..... بیماری کودک □ |
|--|--|---|