

## Acetaminophen

اشکال دارویی

Syrup = 120 mg / 5 cc  
Pediatric suppositories = 125 mg  
Drop = 100 mg / 1 cc  
Suppositories = 325 mg  
tablet = 325 mg  
tablet = 500 mg

مقدار مصرف : 10-15 mg/kg/dose

---

## Ibuprofen ایبوپروفن

اشکال دارویی

Syrup = 100 mg / 5 cc  
Coated tablet = 200  
Coated tablet = 400 mg

مقدار مصرف : 5-10 mg/kg/dose هر ۶-۸ ساعت

---

## آموکسی سیلین

اشکال دارویی

Cap 500 mg  
Cap 250 mg  
Suspension 125/mg 5cc  
Suspension 250/mg 5cc

مقدار مصرف : 40-50 /kg میلیگرم و در درمان اتیت ۸۰-۹۰ /kg میلی گرم در روز در دوزهای منقسم هر ۸ ساعت

---

## Azithromycin آزیترومایسین

اشکال دارویی

Cap 250 mg  
Suspension 100 mg/5 cc  
Suspension 200 mg 5 cc

مقدار مصرف : 10/kg میلیگرم روز اول و روزهای بعد 5/kg میلیگرم

---

## Cefexim سفکسیم

اشکال دارویی

Syrup 100 / 5 cc  
Cap 200  
Cap 400

مقدار مصرف : 8 mg/kg در روز

---

اشکال دارویی

Capsul 625 mg  
Capsul 375 mg  
Suspension 156 mg /5 cc  
Suspension 312 mg /5 cc

مقدار مصرف : بر اساس آموکسی سیلین محاسبه می شود .

---

اشکال دارویی

Syrup 100mg /5 cc  
Tablet 400mg

**Erythromycin: اریترومایسین**

مقدار مصرف : در اطفال 40mg/ kg در روز در دوزهای منقسم ۶-۸ ساعت

---

اشکال دارویی

Syrup 125mg /5 cc  
Syrup 250mg /5 cc  
Cap 250 mg  
Cap 500 mg

**Cephalexin : سفالکسین**

مقدار مصرف : در اطفال 50-75mg/ kg در روز در دوزهای منقسم ۶ ساعت

---

اشکال دارویی

Tablet 500 mg  
Oral suspension 60 mg/ 1 cc

**Nalidexic Acid نالیدکسیک اسید**

کودکان بزرگتر از ۳ ماه 55/kg میلیگرم خوراکی در دوز منقسم ۶ ساعته  
مصرف دارو در کمبود G6 PD ممنوع است .

---

اشکال دارویی

Adut tablet 400mg/80mg  
Pediatric tablet 100mg/20mg  
Suspeosion 200/5 cc

**Co-trimoxazole کوتریموکسازول**

مقدار مصرف : در کودکان بر اساس مقدار تری متوپریم 8-10 mg/kg در روز در دوز منقسم ۱۲ ساعته  
مصرف این دارو در کمبود G6 PD ممنوع است .

---

اشکال دارویی

Tab 250 mg  
Suspeosion 125mg/5 cc

**Metronidazole مترونیدازول**

مقدار مصرف: درمان آمیبیاز 35-50mg/kg در روز در دوزهای منقسم ۸ ساعته  
درمان ژیا ردیا 15mg/kg در روز در دوز منقسم ۸ ساعته

---

## Diphenhydramin هیدارمین

آنتی هیستامین آنتاگونیست H 1

اشکال دارویی

Syrup 12/5 mg/5

مقدار مصرف : 1-2 mg /kg/dose یا برابر 5mg/kg در روز در دوزهای منقسم ۶ ساعت

### شربت دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramin compound

ترکیب :

دیفن هیدرامین = 12/5 mg/5cc میلیگرم

آمونوم کلراید = 12/5 mg/5cc میلیگرم

سدیم ساخارین - 2/7 /5cc میلیگرم

مقدار مصرف بر اساس دیفن هیدرامین محاسبه می شود .

## Hydroxyzine هیدروکسی زین

آنتی هیستامین آنتاگونیست H 1

اشکال دارویی

Syrup 10 mg /5 cc

Coated tablet =10 mg

Coated tablet =25 mg

مقدار مصرف : 2/kg میلیگرم در روز در دوز های منقسم ۸-۶ ساعت

## promethazine پرومتازین

اشکال دارویی

Syrup 6.25mg/5cc

Tab 12.5mg

مقدار مصرف :

در کودکان بالاتر از ۲سال :

آنتی هیستامین 0.1 mg/kg هر ۶ ساعت

ضد استفراغ 0.25-1mg/kg هر ۴-۶ ساعت

استفراغ مسافرتی : 0.5mg/kg نیم تا یکساعت قبل از حرکت

مصرف در کودکان کمتر از ۲سال توصیه نمی شود

اشکال دارویی

Tab 10 mg

Syrup 5 mg /5 cc

Cetirizine آنتی هیستامین نسل دوم

مقدار مصرف :

کودکان ۲-۵ سال 2/5 mg و حداکثر 5mg در روز

کودکان بالای ۶ سال 5-10 mg در روز

## Dexeromethorphan دکسترومتورفان

اشکال دارویی

Syrup 15 mg /5 cc

مقدار مصرف :

کودکان ۲-۶ سال ۲/۵-۷/۵ میلیگرم از طریق خوراکی هر ۶-۸ ساعت  
کودکان ۶-۱۲ سال ۱۰-۱۵ میلیگرم هر ۶-۸ ساعت

---

### دکسترومتورفان P : P Dextromethorphan

ترکیبات :

دکسترومتورفان 15mg /5 cc

پسودوافرین 30 mg/cc

مقدار مصرف :

کودکان ۲-۵ سال 2/5 cc هر ۶ ساعت

کودکان ۶-۱۲ سال 5cc هر ۶ ساعت

---

### رانیتیدین Ranitidin

آنتا گوسنیت گیرنده H2

tablet 150 mg

Injection 50 mg/2 cc

مقدار مصرف : 2-5 mg/kg در روز در دوز منقسم ۸-۱۲ ساعته

---

### سایمتیدین Cimetidin

Tablet 200 mg

مقدار مصرف : کودکان 20-40 /kg میلیگرم روانه در روز منقسم ۶ ساعته

---

### Omeprazol

Cap 20 mg

مقدار مصرف : 0/6-3 /kg/dose میلیگرم خوراکی

اشکال دارویی

tablet =10 mg

Drop 4 /1 cc میلیگرم

Injection 10 my/2 cc

متوکلوپیرامید Metoclopiramide

مقدار مصرف :

درمان ریفلاکس 0/1=0/2 mg/kg/dose

درمان استفراغ : پس از شیمی درمانی 1-2mg/ /dose و در استفراغ ساده با مقدار کمتر تجویز می شود .  
جهت کاهش عوارض اکستراپیرامیدال ، همزمان با استفاده از آن باید از دیفن هیدرامین استفاده کرد .

اشکال دارویی

فروسولفات Ferrous Sulfate

Drop Ferrous Sulfate 25 mg /1cc

Syrup ferrousulfate 40mg/1 cc

مقدار مصرف بر اساس آهن المانته محاسبه می شود .

دوز پیشگیری 1-2 mg/kg روزانه

دوز درمانی 4-6 mg/kg روزانه

اشکال دارویی

Suspension 5 mg/5cc

**سولفات روی zinc sulfat**

مقدار مصرف : 1-2 mg/kg از روی المانته روزانه

**قطره نیستاتین Nystatin** : ضد قارچ

Suspension Drop 100/000/unit /1 cc

مقدار مصرف: شیرخواران 100/000-200/000 واحد ۴ بار در روز

**سالبوتامول Salbutamol** : گشاد کننده برونش

اشکال دارویی

Syrup 2 mg /5 cc

Spray 100 mcg/puff

مقدار مصرف :

خوراکی : کودکان ۲-۵ سال 0/1-0/2mg/kg از طریق خوراکی سه بار در روز شروع اثر ۳۰ دقیقه بعد

استنشاقی : برونکواسپاسم : 200mcg ( ۲ پاف ) و هر ۴-۶ ساعت

درمان حمله آسم : ۲ پاف هر ۲۰ دقیقه تا یک ساعت و بعد ۲ پاف هر ساعت تا ۴ ساعت

جلوگیری از برونکواسپاسم بدنبال ورزش و فعالیت : ۲- ۱ پاف ۳۰-۵ دقیقه قبل از ورزش

Oral spray 250 mcg /dose

Oral spray 50 mg/dose

Nasal spray

**بکلومتازون Beclomethasone**

اسپری دهانی : کودکان ۲-۱ پاف دو بار در روز

اسپری بینی : رنیت الرژیک یک پاف در هر سوراخ بینی ۳ بار در روز

اشکال دارویی

Tablet=5 mg

**پردنیزولون prednisolone**

مقدار مصرف : 1-2mg/kg روزانه در دوز منقسم ۸-۶ ساعته

**دگزامتازون Dexamethasone**

اشکال دارویی

tablet 0/5mg

Injection 8 mg/2

مقدار مصرف : 0/1-0/2mg/kg روزانه در دوزهای منقسم

درمان کروپ : 0/4-0/6mg/kg تزریقی

اشکال دارویی

Coated tablet =10 mg

Elixir 10 mg/5 cc

مقدار مصرف : کودکان بزرگتر از ۶ ماه 5-10 mg از طریق خوراکی ۸-۶ ساعت

### گریب میکسچر **Gripe mixture**

آنتی اسپاسمودیک درمان نفخ و اسپاسم

مقدار مصرف در نوزادان : ۱ قاشق چایخوری بر حسب نیاز

کودکان ۶-۱ ماه : یک قاشق مرباخوری بر حسب نیاز

کودکان ۲-۶ ماه : دو قاشق مرباخوری

کودکان بزرگتر از ۲ سال : ۲-۳ قاشق مرباخوری بر حسب نیاز

### **Gripe water** گرایپ واتر : ضد نفخ

مقدار مصرف : نوزادان یک قاشق چایخوری ۶-۴ بار در روز

کودکان : یک قاشق مرباخوری هر ۶-۴ با در روز

### قرص سرماخوردگی **Tab Adult cold**

ترکیبات :

استامینوفن = ۳۲۵ میلیگرم

فنیل افرین = ۵ میلیگرم

کلرفنیرامین = ۲ میلیگرم

کودکان ۶-۱۲ سال یک قرص هر ۶-۴ ساعت

مقدار مصرف : بر اساس استامینوفن محاسبه می شود .

### شربت سرماخوردگی **Pediatric Gripe**

ترکیبات :

کلرفنیرامین مالئات ۶۷٪ میلیگرم در ۵ میلی لیتر

پسودوافدرین ۱۰ میلیگرم در ۵ میلی لیتر

مقدار مصرف : ۶-۱۲ ماه ۲ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت

۶-۱ سال ۴ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت

۶-۱۲ سال ۴ میلی لیتر هر ۸-۶ ساعت